

Übungen zur Vorlesung Mathematische Methoden der Biowissenschaften III
Fourieranalysis und ausgewählte Kapitel der Stochastik

Blatt 4

Aufgabe 12:

Zeigen Sie, dass die folgenden f_n alle in $L^2([-\pi, \pi])$ liegen. Zeigen Sie dann, dass die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ keine Cauchyfolge bzgl. $\|\cdot\|_2$ ist, wobei

$$f_n : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \begin{cases} n^2x + n & \text{für } -\frac{1}{n} \leq x < 0 \\ -n^2x + n & \text{für } 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Aufgabe 13:

Wir wissen wie ein Innenprodukt eine Norm definiert: $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Zeigen Sie, dass man umgekehrt aus der Norm das Innenprodukt zurückbekommt durch

$$\langle x, y \rangle = \left\| \frac{x+y}{2} \right\|^2 - \left\| \frac{x-y}{2} \right\|^2.$$

Aufgabe 14:

Zeigen Sie, dass in ℓ^2 (s. Skript) durch $e_1 = (1, 0, 0, 0, \dots)$, $e_2 = (0, 1, 0, 0, 0, \dots)$, $e_3 = (0, 0, 1, 0, 0, \dots)$, $e_4 = (0, 0, 0, 1, 0, 0, \dots)$ usw ein maximales ON-System gegeben ist.

Aufgabe 15:

Zeigen Sie, dass die folgenden Funktionen linear unabhängig sind:

$$f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 1; \quad s : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, s(x) = \sin(x);$$

$$c : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, c(x) = \cos(x)$$

(Tipp: Das sind sie laut Definition, falls aus $\alpha f + \beta s + \gamma c = 0$ folgt, dass $\alpha = \beta = \gamma = 0$ ist. Und $\alpha f + \beta s + \gamma c = 0$ heißt: Für alle $x \in [-\pi, \pi]$ folgt: $\alpha f(x) + \beta s(x) + \gamma c(x) = 0$. Also insbesondere für bestimmte x , die man sich geschickt aussuchen darf...)