

## 12. Übung zur Vorlesung Lineare Algebra 1

**Abgabetermin: Do, 2.2.06**

**Aufgabe 1.** Sei  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  ein euklidischer oder unitärer Vektorraum. Für einen Endomorphismus  $f \in \text{End}(V)$  bezeichne  $f^* \in \text{End}(V)$  die Adjungierte von  $f$ . Zeigen Sie:

- (a) Für  $f \in \text{End}(V)$  sind  $f \circ f^*$  und  $f + f^*$  selbstadjungiert.
- (b) Seien  $f, g \in \text{End}(V)$  beide selbstadjungiert. Zeigen Sie, dass  $f \circ g$  genau dann selbstadjungiert ist, wenn  $f \circ g = g \circ f$  ist.

**Aufgabe 2.** Sei  $V$  ein  $\mathbb{C}$ -Vektorraum und  $\xi : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$  eine Sesquilinearform. Wir zerlegen

$$\xi(v, w) = \beta(v, w) + i\gamma(v, w)$$

in Realteil  $\beta(v, w) \in \mathbb{R}$  und Imaginärteil  $\gamma(v, w) \in \mathbb{R}$ .

- (a) Verifizieren Sie, dass  $\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  und  $\gamma : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  zwei  $\mathbb{R}$ -Bilinearformen auf  $V_{\mathbb{R}}$  sind (dabei bedeutet der Index  $\mathbb{R}$  bei  $V_{\mathbb{R}}$ , dass wir  $V$  nur als reellen Vektorraum auffassen).
- (b) Zeigen Sie, dass die Bilinearformen  $\beta$  und  $\gamma$  invariant unter der Multiplikation mit  $i \in \mathbb{C}$  sind, d.h. es gilt  $\beta(iv, iw) = \beta(v, w)$  und  $\gamma(iv, iw) = \gamma(v, w)$  für alle  $v, w \in V$ .
- (c) Zeigen Sie, dass die folgenden drei Aussagen äquivalent sind:  
(i)  $\xi$  ist hermitesch, (ii)  $\beta$  ist symmetrisch, (iii)  $\gamma$  ist alternierend.
- (d) Sei jetzt  $\xi$  ein hermitesches Skalarprodukt und  $(v_1, \dots, v_n)$  eine ON-Basis von  $V$  (bzgl.  $\xi$ ). Zeigen Sie, dass dann  $(v_1, iv_1, v_2, iv_2, \dots, v_n, iv_n)$  eine ON-Basis von  $V_{\mathbb{R}}$  ist (bzgl.  $\beta$ ).

**Aufgabe 3.** Sei  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  ein euklidischer oder unitärer Vektorraum und  $f : V \rightarrow V$  ein normaler Endomorphismus (d.h. es gilt  $f \circ f^* = f^* \circ f$ ). Zeigen Sie:

(a)  $\text{Kern}(f) = \text{Kern}(f^*)$ .

(b)  $\text{Kern}(f)^\perp = \text{Bild}(f)$ .

(c) Ist  $f^3 = f^2$ , so ist  $f$  ein Projektor. Gilt diese Aussage auch für nichtnormale Endomorphismen?